


## SNAP Cortisol

- **Badania przesiewowe w kierunku hipo-** i hiperadrenokortycyzmu – zacznij leczenie lub wykonaj badania kontrolne w czasie jednej wizyty
- **Zadowolenie właściciela zwierzęcia** – gotowe odpowiedzi przy wypisywaniu zwierzęcia do domu
- **Monitorowanie przebiegu leczenia** – używane jako element oceny skuteczności leczenia, pozwalający na dokonywanie w razie konieczności zmian w terapii

## Korelacja pomiarów kortyzolu na czytniku SNAP® Reader z pomiarami wykonanymi metodą radioimmunologiczną

Każda seria SNAP® Cortisol jest badana z surowicą pochodzącą od psów zdrowych i psów badanych w kierunku choroby nadnerczy po wykonaniu albo testu hamowania deksametazonem albo testu stymulacji ACTH.



Możesz mieć pewność dokładności pomiarów kortyzolu.



## Możliwości wykonywania pomiarów kortyzolu

### KORTYZOL

#### Choroba Addisona (hipoadrenokortycyzm)

##### Objawy

- brak łaknienia
- osowiałość
- depresja
- wymioty
- zespół narastania/ubywania (ang. „waxing/waning”)
- biegunka
- rzadkoskurcz
- hiponatremia/hiperkalcemia

#### Zespół Cushinga (hiperadrenokortycyzm)

##### Objawy

- wzmożone pragnienie/wielomocz
- nadmierny apetyt
- powiększenie powłok brzusznych
- wyłysienia
- dyszenie
- otyłość

#### Monitorowanie przebiegu leczenia

